



CIMED 1316717BG0824 - BIS NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM BG18

Dimensões área de impressão: 88 x 149,50 mm
Diâmetro da bisnaga: Ø 28

Cores:

- Pantone 709 C
- Pantone 7548 C
- Preto

nistatina + óxido de zinco 6,3 mm - 100%
100.000 UI/g + 200 mg/g 4 mm ≥ 50%

TRATAMENTO DE ASSADURAS 2,7 mm

Protege Cicatriza Alivia 2,1 mm

SAC: 0800 704 46 47 2 mm
cimedremedios.com.br 1 mm

Pomada - Uso dermatológico 2 mm
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Peso Líquido: **60 g** 2,4 mm

CIMED 2,74 mm ≤ 50%

Indicações: para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas, em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito. **Contraindicações:** não deve ser utilizado se você for alérgico à nistatina, ao óxido de zinco ou aos demais ingredientes do produto. Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Registrado por:
CIMED INDÚSTRIA S.A.
CNPJ: 02.814.497/0001-07
Produzido por:
CIMED INDÚSTRIA S.A.

Indústria Brasileira



CIMED 1316719CT0824 - CART NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM CT187

Posição do CIV: Vincos 2 e 4 à 40mm da base do CT

- Cores:**
- Black
 - Pant. 116 C
 - Pant. 2062 C
 - Pant. 7548 C
 - Pant. 276 C
 - Pant. 709 C
- Acabamentos:**
- ▭ Reserva de verniz B.A

nistatina 7,0 mm - 100%

+ óxido de zinco

100.000 UI/g 4,3 mm ≥ 50%


+ 200 mg/g

CIMED 2,74 mm ≤ 50%

Pomada - Uso dermatológico 2 mm

USO ADULTO E PEDIÁTRICO 2 mm

Peso Líquido: **60 g** 2 mm



Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). 2,10 mm - 30%

Proteger da luz e umidade.

Cada grama contém: 100.000 UI de nistatina, 200 mg óxido de zinco. CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES. **Indicações:** a indicação principal deste medicamento é para assaduras de bebês, principalmente relacionadas ao uso de fraldas. Além desta indicação, este medicamento pode ser usado em crianças maiores e adultos, no tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, nas axilas, sob os seios ou em outras áreas da pele que sofrem atrito. **Contraindicações:** este medicamento não deve ser utilizado se você for alérgico à nistatina, ao óxido de zinco ou aos demais ingredientes do produto. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de um profissional de saúde.**

Registro: 1.4381.0222.002-4 1 mm

Registrado por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.**

CNPJ: 02.814.497/0001-07

Produzido por: **CIMED INDÚSTRIA S.A.** 1,41 mm

Indústria Brasileira

SAC 0800.704.46.47 2,10 mm

cimedremedios.com.br 1 mm

